

Colon stoma

Dikke darmonderzoek bij een stoma

Belangrijk

Röntgenstralen kunnen schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Als u zwanger bent of denkt te zijn, neemt u dan contact met ons op!

Als u hierover twijfelt, moet het onderzoek binnen 10 dagen na het begin van de menstruatie plaatsvinden.

Inleiding

U bent door uw arts naar de afdeling Radiologie verwezen voor een onderzoek van de dikke darm. In overleg met uw arts heeft u hiermee ingestemd. Via deze folder willen wij u uitleg geven over dit onderzoek. De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat de radioloog(arts die het onderzoek verricht) een andere methode kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Het is niet mogelijk in deze folder alle varianten en alternatieven te vermelden.

Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is het zichtbaar maken van de dikke darm met behulp van een contrastmiddel. Hiermee kan gecontroleerd worden of de anastomose (= directe verbinding tussen 2 darm-uiteinden, ook wel naad genoemd) goed dicht is.

Vorbereiding

In overleg met de colincare-verpleegkundige is de afspraak gemaakt. Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de colincare-verpleegkundige.

Zij neemt u mee naar de afdeling Radiologie waar u als voorbereiding een ½ uur voor het onderzoek een klysma krijgt.

Het doel van het klysma is om eventuele verontreiniging in de dikke darm bij de anastomose weg te spoelen.

U hoeft voor dit onderzoek niet nuchter te zijn. Wel is het verstandig om stomamateriaal mee te nemen.

Medicijnen

Medicijnen mag u op de gebruikelijke manier innemen.

Voor het onderzoek

Trek gemakkelijke kleding aan en laat sieraden zoveel mogelijk thuis.

Tijdens het onderzoek

U kunt plaatsnemen op de onderzoekstafel. De laborant brengt in uw anus een slangetje in. De radioloog laat via het slangetje contrastvloeistof in de darm lopen. U kunt hierdoor aandrang en/of kramp krijgen. Soms spuit de radioloog een middel (Buscopan) in uw arm om de darm te ontspannen. Het is mogelijk dat u daarna ongeveer tien minuten wat minder scherp ziet. De radioloog vraagt u om in verschillende richtingen te draaien en tijdens het maken van de opnames uw adem stil te houden en niet te bewegen.

Het onderzoek zal ongeveer een half uur tot drie kwartier duren.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kunt u last krijgen van buikkrampen. Het is raadzaam om eerst het toilet te bezoeken voordat u naar huis gaat.

Uitslag

De aanvragend arts heeft met u besproken op welke manier u de uitslag zult krijgen.

Tot slot

Bij verhindering verzoeken wij u tijdig contact met ons op te nemen. Hierdoor kunnen wij de voor u geplande tijd voor andere patiënten gebruiken.

Wij maken dan een nieuwe afspraak met u.

Heeft u nog vragen?

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen voorafgaand aan het onderzoek. Bovendien kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 16.00 uur telefonisch contact opnemen met de afdeling Radiologie, tel: 0513 685 771.

Vergeet niet uw patiëntenkaart van ziekenhuis Tjongerschans mee te nemen of te laten maken bij de aanmeld- afsprakenbalie.