

Mictie cystogram

Onderzoek van de blaas

Belangrijk:

Röntgenstralen kunnen schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Als u zwanger bent of denkt te zijn, neemt u dan contact met ons op!

Om infecties te voorkomen wordt dit onderzoek liever niet tijdens de menstruatie uitgevoerd.

1 Inleiding

U bent door uw arts naar de afdeling Radiologie verwezen voor een blaasonderzoek. Na overleg met uw arts heeft u hiermee ingestemd. Via deze folder willen wij u informatie geven over dit onderzoek. De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat de arts een andere methode kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Het is niet mogelijk in deze folder alle varianten en alternatieven te vermelden.

2 Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is het zichtbaar maken van de blaas en de plasbuis met behulp van een contrastmiddel. Hiermee kan mogelijk de oorzaak van uw klachten worden vastgesteld.

3 Voorbereiding

U mag één uur voor het onderzoek niet meer naar het toilet.

4 Voor het onderzoek

Trek gemakkelijke kleding aan en laat sieraden zoveel mogelijk thuis.

U wordt verzocht zich tien minuten voor de afgesproken tijd bij de balie van de afdeling Radiologie te melden.

U kunt plaatsnemen in de wachtkamer. Als u aan de beurt bent, haalt de laborant u op en brengt u naar het kleedkamertje. Daar wordt u verteld wat u uit kunt trekken. De laborant haalt u via de andere deur uit het kleedkamertje.

5 Tijdens het onderzoek

U wordt verzocht plaats te nemen op de onderzoekstafel. U trekt de benen op zodat de arts een dun slangetje via de plasbuis in de blaas kan brengen. De urine die in de blaas zit, loopt via dit slangetje in een potje wat eventueel voor een urinekweek gebruikt wordt. Als de blaas leeg is, laat de radioloog (de arts die het onderzoek zal uitvoeren) contrastvloeistof in de blaas lopen door het slangetje aan te sluiten op een infuussysteem. De blaas moet maximaal gevuld worden. Als deze vol is wordt het slangetje er meestal uitgehaald. De radioloog zal u vragen uit te plassen. Tijdens vulling van de blaas en tijdens het plassen worden opnames gemaakt.

Het onderzoek zal ongeveer een half uur duren.

6 Na het onderzoek

De eerste uren na het onderzoek kan een branderig gevoel optreden bij het plassen. Soms kan een blaasontsteking ontstaan. Doorgaans helpt u dit te voorkomen door na het onderzoek gedurende de dag minimaal één liter extra te drinken.

7 Uitslag

De aanvragend arts heeft met u besproken op welke manier u de uitslag zult krijgen.

8 Tot slot

Bij verhindering verzoeken wij u tijdig contact met ons op te nemen. Hierdoor kunnen wij de voor u geplande tijd voor andere patiënten gebruiken. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u.

Heeft u nog vragen?

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen voorafgaand aan het onderzoek. Bovendien kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 16.00 uur telefonisch contact opnemen met de afdeling Radiologie, tel: 0513 685 771.

Vergeet niet uw patiëntenkaart van ziekenhuis "Tjongerschans" mee te nemen of te laten maken bij de aanmeld- / inschrijfbalie!