

# **Herniografie**

## **Onderzoek van de buikwand of buikholte**

## **Belangrijk**

**Röntgenstralen kunnen schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Als u zwanger bent of denkt te zijn, neemt u dan contact met ons op!**

**Als u hierover twijfelt, moet het onderzoek binnen 10 dagen na het begin van de menstruatie plaatsvinden.**

**Bij dit onderzoek wordt een jodiumhoudend contrastmiddel toegediend. Als u ooit een allergische reactie heeft gehad op een jodiumhoudend contrastmiddel is het noodzakelijk om vooraf contact op te nemen met uw behandelend arts, ook wanneer u andere allergieën heeft zoals astma of hooikoorts. Bovendien is het belangrijk dat u allergieën vóór de behandeling aan de radioloog of de laborant meldt.**

## **Inleiding**

U bent door uw arts naar de afdeling Radiologie verwezen voor een onderzoek van de buikwand of buikholte. Na overleg met uw arts hebt u hiermee ingestemd. Via deze folder willen wij u uitleg geven over dit onderzoek. De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat de radioloog (arts die dit onderzoek verricht) een andere methode kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Het is niet mogelijk in deze folder alle varianten en alternatieven te vermelden.

## **Doel van het onderzoek**

Het doel van het onderzoek is het zichtbaar maken van een gedeelte van de buikwand of buikholte met behulp van een contrastmiddel. Hiermee kan mogelijk de oorzaak van uw klachten, zoals een mogelijke liesbreuk, worden vastgesteld.

## **Vorbereiding**

U mag 's ochtends een licht ontbijt (kop thee eventueel met suiker en een beschuit met boter en beleg) gebruiken. Daarna mag u niet meer eten, drinken en roken.

### **Medicijnen**

Medicijnen mag u op de gebruikelijke manier innemen.

## **Voor het onderzoek**

Trek gemakkelijke kleding aan en laat sieraden zoveel mogelijk thuis.

U wordt verzocht zich tien minuten voor de afgesproken tijd bij de aanmeldzuil aan te melden.

Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. Voorafgaand aan het onderzoek wordt u gevraagd om de blaas goed leeg te plassen. Als u aan de beurt bent, haalt de laborant u op en brengt u naar het kleedkamertje. Daar wordt u verteld wat u uit kunt trekken. De laborant haalt u via de andere deur uit het kleedkamertje.

## **Tijdens het onderzoek**

U kunt plaatsnemen op de onderzoekstafel. De huid, links naast de navel, wordt schoongemaakt en gedesinfecteerd. Rondom de aan te prikken plaats worden steriele doeken geplakt, ter voorkoming van infecties. Dit onderzoek wordt onder plaatselijke verdoving uitgevoerd. Met een dunne holle naald prikt de radioloog tussen het buikvlies. Als de naald goed zit, wordt contrastvloeistof ingespoten. De naald wordt verwijderd en er komt een pleister op het wondje. De radioloog vraagt u om in verschillende richtingen te draaien, zodat het con-

trastmiddel goed verdeeld wordt in de buikholte. De onderzoekstafel wordt schuin gezet, waarna opnames gemaakt worden. Tijdens het maken hiervan wordt aan u gevraagd te persen (bolle buik maken).

*Het onderzoek zal ongeveer een half uur duren.*

## **Uitslag**

De aanvragend arts heeft met u besproken op welke manier u de uitslag zult krijgen.

## **Tot slot**

Wilt u, als u verhinderd bent, zo snel mogelijk contact met ons opnemen? Hierdoor kunnen wij de voor u geplande tijd voor andere patiënten gebruiken. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze stellen voorafgaand aan het onderzoek. Bovendien kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 16.00 uur telefonisch contact opnemen met de afdeling Radiologie, tel. 0513 685 771.