


Angiografie / PTA / stentplaatsing



Bij deze patiënt is een angiografie verricht via de re / li
arm / lies

Deze procedure vond plaats op

en is om uur beëindigd.

- Tijdens de procedure is 5000 IE Heparine toegediend!!

- Tijdens de procedure is/zijn de volgende medicijnen toegediend:

.....
.....
.....

Nazorg na terugkomst op de afdeling

- Platte bedrust re / li been gestrekt houden tot uur
en drukverband laten zitten tot uur.
- Strikte bedrust re / li arm gestrekt houden tot uur
en drukverband laten zitten tot uur.
- Halfliggende bedrust tot uur
been losjes ontspannen houden tot uur.
- Pols en tensie meten gedurende de eerste 4 uur (1 maal per uur).
- Verbandinspectie, controleren op nabloeden.
- Arteriële pulsaties en temperatuur van polsen/enkels controleren.
- Patiënt(e) mag eten en drinken, tenzij andere voorschriften gelden (spoed OK bv.).
- Bij complicaties (zoals bv. sterke tensiedaling of stijging van de polsfrequentie) de radioloog (op diens telefoon, tijdens bereikbaarheidsdienst via telefoniste) of de angiolaborant (tel.1300) bellen.

De procedure werd	○	Dr. Hummel	5777
uitgevoerd door:	○	Dr. Belder	5778
	○	Dr. Elsen	5781
	○	Dr. Groeneveld	5779
	○	Dr. Rademakers	5780
	○	Dr. Chin	5782